

Avertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL : 140 F - Régisseur Recettes D.R.A.F. - CCP DIJON 35 00 28 D



80.22.19.38

EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 18 - 17 juin 1987

COLZAAlternaria : *Pas de traitement dans l'immédiat***POIS**Botrytis : *Fongicide dès que possible*Tordeuse : *Localement, traitement à réaliser***TOURNESOL**Pucerons : *A surveiller**Traitement justifié dans quelques cas***P O I S****MALADIES**

SITUATION : Les foyers de Botrytis signalés depuis la semaine dernière, ont progressé.

PRECONISATION : Dans toutes les situations (précoces et tardives), réaliser des traitements dès que possible, selon les conditions météorologiques et le ressuyage des parcelles.

Utiliser des spécialités efficaces sur Botrytis : Céréclair, Bravo plus - 2 l/ha ; B.T.F. - 3,5 l/ha ; Folgan - 3 kg/ha

TORDEUSE

Les préconisations du bulletin précédent sont reconduites.

NIEVRE : Secteur de Donzy : un traitement a été conseillé dans la période du 10 au 15 juin ; à réaliser s'il n'est pas encore fait.

YONNE : Secteur Champlost

COTE-D'OR : Très localement sur Epoisses

} Traitement à prévoir dans la période du 20-25/06.

TOURNESOL**PUCERONS**

SITUATION :

. Grand étalement et hétérogénéité des stades :

- stade bouton étoilé fréquemment rencontré dans la plaine Dijonnaise et Val de Saône.
- dans les autres régions les tournesols se répartissent selon les stades suivants : 30-40 cm de haut avec 3-4 paires de feuilles et plus fréquemment 50-60 cm de haut avec 5-6 paires de feuilles. Dans ce dernier cas le stade bouton étoilé devrait être atteint dans le courant de la semaine prochaine.

. Confirmation de la présence très fréquente de pucerons : Les niveaux de population sont plus importants dans les parcelles les plus développées, et depuis une semaine leur évolution est irrégulière. Dans quelques situations des populations de 60-80 pucerons/plante sont atteintes, mais dans la majorité des cas les niveaux sont de 20-30 pucerons/plante pour les parcelles ayant 50-70 cm de haut.

P. 33

PRECONISATION :

- Dans la majorité des situations, ne pas envisager de traitement dans l'immédiat : attendre encore une semaine avant de prendre une décision.
- Dans quelques parcelles, les niveaux de populations (60 à 80 pucerons/plante) justifient une intervention. Spécialités utilisables : Pirimor - 0,250 kg/ha ; Serk - 1,5 l/ha.

— SCLEROTINIA**SITUATION :**

- Depuis quelques jours des symptômes de Sclérotinia sont signalés. Il s'agit de taches de couleur brun foncé visibles sur jeunes feuilles du cœur ou à proximité. Les nécroses progressent au niveau du pétiole de la feuille vers la tige et le bourgeon terminal.
- Les conditions météorologiques actuelles sont favorables à l'apparition et à la progression de ces symptômes.
- Les dégâts peuvent être importants si le bourgeon terminal est détruit, ce qui commence à être le cas.

PRECONISATION :

Aucune intervention fongicide n'est à envisager.

B L E

Stades : de début floraison à grain aqueux suivant les secteurs et variétés.

SITUATION :

Progression d'Oïdium et de Septoriose notamment en parcelles non protégées.

La Rouille brune ne marque pas de progression importante. Une présence sensible sur F3 et F2 peut cependant être observée localement (Saône-et-Loire).

Pucerons : Les populations demeurent très basses.

PRECONISATION :

En cas d'intervention fongicide tardive (progression parasitaire en situation non protégée) seuls les produits de contact sont utilisables à partir de la floraison.

Aucune intervention anti-pucerons n'est justifiée.

La période de risques Cécidomyies est terminée en situations précoces. Maintenir la surveillance jusqu'à fin floraison dans les autres situations.

CULTURES LEGUMIERES
— DORYPHORES**SITUATION - PRECONISATIONS :**

Les adultes sont présents dans les parcelles de pomme-de-terre et des pontes ont été observées. Surveiller vos cultures et intervenir lorsque les larves atteignent la taille d'un grain de blé.

— MILDIOU**PRECONISATIONS :**

Les traitements contre les Mildiou de la pomme-de-terre et de l'oignon, conseillés dans le précédent bulletin, qui n'ont pu être effectués sont à réaliser dès qu'il sera possible de pénétrer dans les parcelles.